

การจัดการแบบมีส่วนร่วมในความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะม่วงแก้ว บนเขตนิเวศที่ดอน¹

Participatory management of Kaew mango genetic diversity in upland ecoregion

ทวัชชัย รัตนชาless พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์ และ ปฐมา เดชะ
Tavatchai Radanachalee, Phrek Gypmantasiri, Rungthip Utumpan and Patama decha

Abstract

Management of crop genetic diversity traditionally is carried out by researchers by studying and conserving *ex situ* without participation of farmer community. As the consequence the study provides few direct benefit to the community.

The research on development and production of Kaew mango for upland ecoregion for fresh consumption and processing, include studying and conserving activities on crop genetic diversity through participation of researchers, farmers and food processors. The researchers, based on local information, had selected and collected 52 promising Kaew mango clones from upland farmers distributed over 8 provinces of the Upper North. The collected materials were planted and conserved in the experimental station of Chiang Mai University and in the farmer plots at the Chom Tong Land Reform Project, Chiang Mai Province. The original mother clones were monitored with the owner-farmers at the sites. The Upper North Kaew Mango Farmers Network was set up and was participated in evaluating the 52 progeny clones in the university experimental station and at the Chom Tong Land Reform Project.

The 52 progeny clones showed morphological and isozyme diversities. The desirable characteristics for fresh consumption and processing as determined jointly by farmers, food processors and researchers were present in the collected population. Therefore the chance of success in developing Kaew mango suitable for fresh consumption and processing, based on existing genetic resources, is expected to be high. The final process of development and production of Kaew mango will be the involvement of farmers in the network to participate in the clonal selection, on-farm

¹ เอกสารประกบภาคโปรดักส์ ในการสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทวัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน” วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2543 ณ โรงแรมมหุยส์ แทรเวล, กรุงเทพฯ (MCC Agri. Syst. Working Paper No.135)

testing, and multiplication of promising clones adapted in the upland ecoregion of the Upper North.

The participatory management has showed to be effective in knowledge and technology transfer between the experienced and less experienced farmers, particularly when mango is integrated with forage legume crops and perennial trees as windbreak for sustainable landuse.

Key words: genetic diversity, integrated farming systems, sustainable agriculture, Kaew mango, upland ecoregion

บทคัดย่อ

การจัดการความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช แต่เดิมมักจะทำโดยนักวิจัย และดำเนินการศึกษาและอนุรักษ์ออกถิ่นเดิม (*ex situ*) ชุมชนที่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการงาน การดังกล่าว ทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากการศึกษาประเภทนี้น้อยมาก

งานวิจัยการพัฒนาและการผลิตมะม่วงแก้วบันแขวนที่ดอน เพื่อบริโภคผลสดและอุดสาหกรรมแปรรูป ประกอบด้วยการศึกษา และอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช อย่างมีส่วนร่วมของนักวิจัย เกษตรกร และผู้ประกอบการ นักวิจัยอาศัยข้อมูลท้องถิ่นได้คัดเลือก และรวบรวมมะม่วงแก้วสายต้นดีของเกษตรกรที่ดอน ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน จำนวน 52 สายต้น มาปลูกเพื่อนำราก และคัดเลือก ในสถานีทดลองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในพื้นที่เป้าหมายของเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโครงการป่าจากมอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการติดตามผลสายต้นแม่พันธุ์ร่วมกับเจ้าของในพื้นที่เดิม พร้อมทั้งได้ จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงแก้วภาคเหนือตอนบน สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการศึกษา ประเมินลักษณะมะม่วงแก้ว 52 สายต้น ในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในพื้นที่ของเกษตรกร ณ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมป่าโครงการป่าจากมอง

มะม่วงแก้ว 52 สายตันลูกรุ่นแรก มีความหลากหลายทางสัณฐานและลักษณะทางไอโซไซเมิร์ นอกจากนี้ลักษณะที่ต้องการทางบริโภคผลสด และอุดสาหกรรมแปรรูป ที่ร่วมกันกำหนดโดยเกษตรกร ผู้ประกอบการ และนักวิจัย ได้ปรากฏในประชากรดังกล่าว ดังนั้นโอกาสที่จะพัฒนาพันธุ์มะม่วงแก้วที่เหมาะสมกับการบริโภคผลสด และอุดสาหกรรมแปรรูป โดยอาศัยฐานพันธุกรรมที่มีอยู่เป็นไปได้สูง กระบวนการพัฒนา และการผลิตมะม่วงแก้วขั้นสุดท้าย เกษตรกรในเครือข่ายจะมีส่วนร่วมในการคัดเลือกสายตันมะม่วง เพื่อทดสอบในพื้นที่ของตน และจะมีบทบาทในการเผยแพร่กระจายพันธุ์ในพื้นที่ดอนภาคเหนือตอนบน

การจัดการแบบมีส่วนร่วมได้แสดงให้เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างเกษตรกรที่มีประสบการณ์และต่อยประสมการน์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อการผสมผสานมะม่วงแก้วกับกิจกรรม การปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ พืชคลุมดิน และการปลูกไม้กันลม เพื่อการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน

คำหลัก: ความหลากหลายทางพันธุกรรม ระบบเกษตรผสมผสาน เกษตรยั่งยืน มะม่วงแก้ว เขตนิเวศที่ดอน

บทนำ

แก้วเป็นพันธุ์มะม่วงที่มีพื้นที่การปลูกมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งในเขตภาคเหนือ ตอนบน มะม่วงแก้วได้ถูกนำมาใช้ทั้งการบริโภคผลสดและแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการหลังที่มะม่วงแก้วมีบทบาทมากกว่าพันธุ์อื่นๆ จากความต้องการวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพสูง สามารถที่จะแข่งขันในตลาด การค้าเสรีในอนาคตอันใกล้ได้ ประกอบกับการที่มะม่วงแก้ว เป็นพันธุ์ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างสูง ทั้งยังมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนของผู้ด้อยโอกาสในเขตนิเวศที่ดอน (upland ecoregion) พื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน จึงถูกผลักดันให้มีการศึกษาพัฒนาการผลิตมะม่วงแก้วเพื่อการบริโภคผลสดและอุตสาหกรรมแปรรูป สำหรับที่ดอนอาศัยน้ำฝนขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา โดย ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทรัพยากรทางพันธุกรรมของมะม่วงแก้ว

ภาคอีสานของประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะม่วงแก้วมากที่สุด หรือราวร้อยละ 56 ของพื้นที่ปลูกมะม่วงแก้วทั่วประเทศ และซัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคเหนือ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกราวร้อยละ 25 โดยเฉพาะที่จังหวัดตาก ส่วนภาคเหนือตอนบนมีจังหวัดเชียงใหม่ปลูกมากที่สุด เนื่องจากเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ปลูกรวมทั้งที่ให้ผลผลิตแล้ว และยังไม่ให้ผลผลิต 32,030 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2543) สำหรับภาคเหนือตอนบนซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน นั้น ตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร (ตารางที่ 1) ร่วมกับการสำรวจพบว่า มะม่วงแก้วมีการปลูกในทุกจังหวัด และแหล่งปลูกที่สำคัญได้กระจายอยู่ในเขตนิเวศที่ดอน ซึ่งโดยสั้งเขปหมายถึงบริเวณที่ตั้งอยู่สูงประมาณ 300-500 เมตร เนื้อระดับน้ำทะเลเป็นกลาง พื้นที่มีความลาดชันเล็กน้อยไม่เกินร้อยละ 9 ส่วนใหญ่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำ และอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก