

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลังงานและปริมาณคาร์บอนฟุตพรินท์สำหรับการผลิตยางพารา ในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย (ไม่รวมจังหวัดสงขลา) โดยทำการเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการขันส่งต้นกล้ามาถึงแปลงปลูก การเตรียมพื้นที่ การปลูก การบำรุงรักษาหลังการปลูก การรีดยางพารา การขันส่งผลผลิตจากแปลงยางพาราของเกษตรกร ข้อมูลที่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นค่าพลังงานโดยใช้ค่าพลังงานเทียบเท่าจากนั้นทำการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพรินท์และคาร์บอนกักเก็บ โดยมีพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวน 740 แปลง รวมพื้นที่ 9,126 ไร่ ผลการศึกษาพบว่าเกษตรรสามารถผลิตผลผลิตจากต้นยางพาราได้เฉลี่ย 217.16 kg/ไร่/ปี สำหรับการผลิตน้ำยางสด หรือ เท่ากับ 165.70 kg/ไร่/ปี สำหรับการผลิตก้อนถัวยและได้ผลผลิตไม้ยางพาราที่ปีที่ 25 ค่าเท่ากับ 43.14 ตัน/ไร่ ด้านการใช้พลังงานพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.27 MJ/kg น้ำยางสด หรือ 15.03 MJ/kg ยางก้อนถัวยมีการปล่อย GHG ในรูปของ CO_2 เทียบเท่า เท่ากับ 0.77 kg CO_2 eq/kg น้ำยางสด หรือ 0.81 kg CO_2 eq/kg ยางก้อนถัวย ต้นยางพาราที่มีอายุ 25 ปี สามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 8,719.11 kg CO_2 /ไร่ ดังนั้นการปลูกยางพาราสามารถลดการปล่อย GHG ในรูปของ CO_2 เทียบเท่า ได้ 4,529.49 -5,356.65 kg CO_2 /ไร่ ขึ้นอยู่กับว่าผลผลิตจะเป็นน้ำยางพาราสดหรือยางก้อนถัวย สำหรับการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวมาทำการปลูกยางพารานั้นจะมีการปล่อย GHG ในรูปของ CO_2 เทียบเท่า ที่น้อยลง 18.69-34.74%

The objective of this study was to assessments the energy consumption and carbon footprint of rubber production. The production factors in rubber production process were recorded from 13 southern provinces. The process consists of transportation, soil preparation, transplantation, cultural practice and rubber tappers. The production factors were changing the energy value by using energy equivalent value. Carbon footprint and carbon sequestration was assessments. The study area is 740 farms with 9,126 Rai (1 Rai = 1,600 m²). It was found that the yield is 217.16 kg/Rai/year and 165.70 kg/Rai/year for latex and rubber cup lump respectively, and 43.14 tons/Rai of rubber wood at 25 years old of the rubber tree. The energy consumption and CO_2 emission for producing latex is 20.27 MJ/kg and 0.77 kg CO_2 eq/kg respectively. The energy consumption and CO_2 emission for producing cup lump is 15.03 MJ/kg and 0.81 kg CO_2 eq/kg respectively. The carbon sequestration of 25 years old rubber tree is 8,719.11 kg CO_2 /Rai. So, rubber tree can reduce CO_2 emission 4,529.49 -5,356.65 kg CO_2 /Rai it depends on the product. Rubber farm can reduce CO_2 emissions about 18.69-34.74% compared with paddy field.